

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DE ENTRE DOURO E MINHO

CONTEÚDO ↓

VINHA – MÍLDIO, BLACK ROT, PODRIDÃO CINZENTA, OÍDIO, ERINOSE, TRAÇA-DA-UVA, CIGARRINHA VERDE, GRANIZO
ACTINÍDEA – PSA
PEQUENOS FRUTOS – PODRIDÃO CINZENTA, DROSÓFILA-DE-ASA-MANCHADA
POMÓIDEAS – PEDRADO, OÍDIO
BATATEIRA – MÍLDIO
ORNAMENTAIS – TRAÇA-DO-BUXO, MÍLDIO DO BUXO, ANTRACNOSE EM CICAS

Elaboração e redação:
Carlos Gonçalves Bastos
(Eng.º Agrícola)
Carlos Coutinho
(Agente Técnico Agrícola)

Fotografia: Carlos Bastos,
Carlos Coutinho, Luís Cardoso
Meneses, Ricardo Rivera
Machado, Teresa Matos
Fernandes

**Monitorização de pragas,
doenças e desenvolvimento
das culturas:**
Carlos Bastos
C. Coutinho
Cosme Neves
(Eng.º Agrónomo)
Licínio Monteiro
(Assistente técnico)

**Produtos fitofarmacêuticos,
compilação, tratamento e
interpretação de dados
meteorológicos**
Carlos Bastos

**Impressão e expedição da
edição em papel:**
Licínio Monteiro

Rede Meteorológica:
António Seabra Rocha
(Eng.º Agrícola)
Cosme Neves
(Eng.º Agrónomo)

Informática
João Paulo Constantino
Fernandes
(Eng.º Zootécnico)

**Fertilidade e conservação do
solo:**
Maria Manuela Costa
(Eng.º Agrónoma)

Apoio:
Deolinda Brandão Duarte
(Assistente operacional)

VINHA

MÍLDIO

Plasmopara vitícola

As precipitações e temperaturas mínimas necessárias, ocorridas nos dias 26 e 27 de abril, criaram condições para infeções primárias de míldio. Prevê-se o aparecimento de manchas, resultantes destas infeções, entre os dias 7 e 8 de maio.

Assim, **recomenda-se a proteção das vinhas** com a aplicação de um fungicida, o mais perto possível desta data.

Se já fez um tratamento contra o míldio e se o período de validade terminou, deve renová-lo. Se o tratamento está ainda válido, trate apenas depois de terminada a validade.

Algumas castas são menos suscetíveis ao míldio, como por exemplo, Alvarinho e Vinhão. Por outro lado, são consideradas castas sensíveis Arinto (Pedernã), Avesso, Borraçal, Trajadura e Tinta Roriz.

No combate ao míldio em viticultura no **Modo de Produção Biológico**, são autorizados, produtos à base de cobre, cerevisana, óleo de laranja e

PODRIDÃO NEGRA (BLACK ROT)

Phyllosticta ampellicida (= Guignardia bidwellii)

Já observámos as primeiras manchas de black rot nas folhas, em pequena quantidade e em videiras mais

adiantadas.

O primeiro período de risco de ataque aos cachos decorre a seguir à floração – alimpa, na formação dos bagos, até ao pintor.

A não ser em locais onde se observem habitualmente ataques graves, não há ainda necessidade de tratar contra o black rot.

Todavia, no caso de decidir tratar, aplique um fungicida anti-míldio de ação simultânea contra o black rot.

No combate ao black rot em vinhas no **Modo de Produção Biológico**, são autorizados produtos à base de **cobre**.

PODRIDÃO CINZENTA

Botrytis cinerea

Não observámos, até ao momento, sintomas de *Botrytis* nos cachos (inflorescências).

De acordo com as previsões meteorológicas, existe alguma probabilidade de chuva no início da próxima semana. No entanto, o risco é reduzido. **Não trate.**

PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO CONTRA A PODRIDÃO CINZENTA

A estratégia de luta contra a *Botrytis* é preventiva, com dois aspetos essenciais:

► Pôr em prática medidas culturais preventivas para diminuir a sensibilidade da parcela à *Botrytis*: reduzir o vigor das

cepas, favorecer o arejamento da vegetação e reduzir ou impedir os fermentos nos bagos (sobretudo pelo oídio e pela traça).

► A estratégia de **proteção química**, deve ser pensada em função da sensibilidade da parcela e das castas e do risco aceitável:

Presença de <i>Botrytis</i>	Risco
Nunca ou raramente	Fraco (parcela pouco ou nada sensível)
Uns anos por outros	Médio (parcela sensível)
Regularmente	Forte (parcela muito sensível)

Devem ser aplicadas **medidas preventivas**, seja qual for o risco na parcela. No caso de **o risco ser fraco, as medidas preventivas podem ser suficientes** para evitar ou diminuir o efeito do ataque do fungo.

► Na plantação de vinhas novas, **limitar o vigor** da Vinha, escolhendo porta-enxertos, castas e até clones, que não confirmam excessivo vigor.




► Numa vinha em produção, o vigor pode ser limitado por uma **fertilização racional**, diminuindo o azoto e pelo **enrelvamento permanente** (semeado, natural ou semi-natural). Este revestimento deve ser cortado regularmente.

► **Arejar** bem os cachos – poda e modo de condução que assegurem uma repartição homogênea dos cachos. A supressão de gomos, na poda, as podas em verde, as desfolhas permitem a circulação do ar e a entrada da luz no interior da vegetação da videira. Estas medidas também permitem uma penetração mais completa das caldas aplicadas nos tratamentos.

► **Evitar os fermentos** nos bagos, fazendo um controlo adequado da traça e do oídio. Evitar também as feridas nos bagos durante a realização de operações de desfolha e de podas em verde.

► Os **tratamentos químicos** devem ser **cuidadosamente realizados**, atingindo muito bem os cachos, em todas as fases do desenvolvimento da Vinha.



OÍDIO DA VIDEIRA

Erysiphe necator

No período de tempo que decorre entre os gomos florais separados (H) e a alimpa (J), a Vinha é mais sensível ao oídio.

Aconselhamos a aplicação de um fungicida com ação simultânea **anti-oídio**. Nesta fase de desenvolvimento da Vinha, os fungicidas sistémicos IBE têm muito boa eficácia.

Em alternativa, pode optar por adicionar à calda anti-míldio um enxofre molhável. O enxofre tem efeitos benéficos na diminuição das populações de ácaros eriofídeos causadores da erinose.

No combate ao oídio em viticultura no **Modo de Produção Biológico**, são autorizados produtos à base de **enxofre**.

ERINOSE

Colomerus vitis

Verificam-se, por toda a Região, ataques de erinose na folha. A erinose, causada por um ácaro microscópico, não afeta a Vinha nesta fase do seu desenvolvimento.

Desaconselha-se a aplicação de acaricidas específicos.



Sintomas precoces de erinose

A aplicação de enxofre no combate ao oídio, é suficiente para limitar e manter em equilíbrio as populações deste ácaro.

TRAÇA-DA-UVA

Lobesia botrana

Não é necessário tratar.

CIGARRINHA VERDE

Empoasca vitis

Ainda não encontramos ninfas de cigarrinha verde nas folhas.

Não existe risco. Não é necessário tratar.

GRANIZO (SARAIVA)

As medidas a tomar, se ocorrer este acidente meteorológico, são as seguintes:

TRATAMENTO	
Tratamento IMEDIATO a todas as videiras, anti-míldio e anti-oídio, adicionando à calda um adubo foliar com elevada percentagem de cálcio. <u>O tratamento será tanto mais eficaz quanto mais rapidamente for efetuado.</u>	
Nota: Não deve ser utilizado cobre por causar maior stress às videiras, nem fosetil de alumínio, por ser incompatível com os adubos foliares.	
INTERVENÇÃO NA VEGETAÇÃO	
Estado da Videira	Forma de Intervenção
Videira pouco afetada	Desponta e poda seletiva eliminando os pânpanos mais danificados
Videira muito afetada	Não fazer qualquer intervenção

ACTINÍDEA (KIWI)

BACTERIOSE DA ACTINÍDEA - PSA

Pseudomonas syringae pv. *actinidiae*

Aproxima-se o início da floração da actinídea. Já são visíveis, nos pomares colonizados pela bactéria, os sintomas de PSA, nas folhas, nos ramos do ano e nos gomos.

Durante a floração, pode ser aplicado contra a PSA, produtos à base de *Bacillus*

amyloliquefaciens (AMYLO-X WG, SERENADE ASO, SERIFEL). Recomenda-se a sua aplicação apenas nos pomares ou nas secções dos pomares onde se detetar a presença de PSA.

Nesta fase e até ao vingamento dos frutos, não deve aplicar cobres.

Para o controlo da PSA no Modo de Produção Biológico, nesta fase do desenvolvimento da actínídea, são autorizadas especialidades à base de *Bacillus amyloliquefaciens*.

Consulte aqui a Ficha Técnica nº 4 (II Série-DRAPN)



Ramos, gomos florais e folhas destruídos pela PSA

POMÓIDEAS

(MACIEIRA, PEREIRA, NESPEREIRA DO JAPÃO, NASHI, CODORNEIRO)

PEDRADO DA MACIEIRA E DA PEREIRA *Venturia inaequalis* e *Venturia pyrina*

É recomendável aplicar agora um fungicida anti-pedrado.

No Modo de Produção Biológico, são autorizados fungicidas à base de **cobre** ou de **enxofre**, no controlo do pedrado. Com as árvores em vegetação, é recomendada a aplicação de enxofre.

OÍDIO DA MACIEIRA *Podosphaera leucotricha*

Nos tratamentos contra o pedrado, utilize fungicidas de ação simultânea contra o oídio.

No Modo de Produção Biológico, podem ser utilizados produtos à base de **enxofre** contra o oídio da macieira (também recomendados contra o pedrado em Modo de Produção Biológico).

BATATEIRA

PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO CONTRA O MÍLDIO DA BATATEIRA

O míldio da batateira, causado pelo fungo *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary, pode causar enormes prejuízos e mesmo a destruição completa da cultura. É necessária uma vigilância rigorosa das parcelas. As infeções podem rapidamente atingir e destruir um batatal.

Fatores que favorecem a instalação e progressão da doença

- condições meteorológicas com humidade elevada e temperaturas acima de 10° C
- terrenos sombrios

- terrenos com má drenagem do ar
- folhagem muito desenvolvida e densa
- solos pesados e húmidos
- existência de rebentos provenientes de batatas deixadas no solo da colheita anterior ou de restos de plantações destruídas pelo míldio e que não foram colhidas
- existência de plantas infetadas nas proximidades

Medidas preventivas

- plantar variedades menos sensíveis à doença
- cultivar diversas variedades
- usar batata-semente sã, certificada
- evitar um desenvolvimento excessivo da folhagem (diminuir a adubação azoto)
- proceder à amontoa, o que diminui o risco de infeção dos tubérculos
- colher com tempo seco
- eliminar os rebentos provenientes de batatas deixadas no solo da colheita anterior
- não deixar no campo os restos da cultura. (Todos os anos, os restos de rama e batatas deixadas nos campos quando da colheita, estão na origem das infeções precoces pelo míldio da batateira. Um monte de rama deixado no campo pode infetar a cultura no ano seguinte num raio de mais de 500 metros em volta. Estes resíduos da cultura podem, além do míldio, disseminar outras doenças da batateira como a fusariose, a podridão mole ou a podridão aquosa).
- fazer um bom controlo, de preferência mecânico, das infestantes.

Luta direta (luta química)

- É realizada por aplicação de **fungicidas com modo de ação preventivo, preventivo-curativo, curativo, erradicante.**

➤ em **agricultura biológica**, o **cobre** é o único meio eficaz de luta contra o míldio permitido, aplicado preventivamente.

➤ o **cobre** é um fungicida de contacto. A folhagem só fica protegida se estiver suficientemente coberta de um depósito de calda antes das infeções. Todas as folhas novas que nascem após a aplicação do fungicida, ficam desprotegidas, pelo que devem ser cobertas de novo tratamento à base de cobre antes das chuvas seguintes.

➤ Uma calda à base de cobre é lavada por 20 mm de chuva continuada ou por 25 mm de chuva acumulada.

➤ para avaliar a situação do míldio no campo, é necessário fazer visitas e observações cuidadas às plantações. Esta operação, longe de ser uma perda de tempo, permite evitar surpresas desagradáveis.

➤ devem-se regular corretamente os pulverizadores, bem como a velocidade dos tratores, de modo a obter uma boa penetração do fungicida no interior da folhagem.

➤ respeitar as doses indicadas nos rótulos dos fungicidas.

ORNAMENTAIS

TRAÇA DO BUXO *Cydalima perspectalis*

Aproxima-se o início do 1º voo da traça e com ele o nascimento de uma nova geração de lagartas. Deve acompanhar a evolução da situação, localmente e **proceder aos tratamentos necessários a partir da deteção das primeiras larvas em atividade**, para evitar a devastação certa dos buxos.


Os inseticidas autorizados são:

TUREX (à base de *Bacillus thuringiensis*)

Este produto é eficaz contra as larvas mais jovens, (1 a 2 cm). A sua eficácia diminui à medida que as larvas se vão desenvolvendo.

Nas fases mais adiantadas do desenvolvimento das larvas, em que atingem 3 a 5 cm de comprimento, deve optar por aplicar **ALIGN** ou **FORTUNE AZA**, inseticidas à base de **azadiractina**.

Ambos os produtos são autorizados no Modo de Produção Biológico e por isso, também indicados para aplicação, em melhores condições de segurança, em ornamentais nos espaços públicos e outros regularmente frequentados.



Larva do 2º estágio ou instar (1 a 2 cm). Imagem ampliada (em cima, imagem próximo do tamanho natural).



Larva do 5º estágio ou instar (4 a 5 cm). Imagem próximo do tamanho natural.

MÍLDIO DO BUXO

***Calonectria pseudonaviculata* (= *Cylindrocladium buxicola*)**

Recomenda-se ► Arrancar e queimar as plantas mortas. ► Podar os ramos doentes. ► Remover as folhas caídas e a parte superficial do solo na proximidade de plantas doentes. ► Ao regar, não molhar a folhagem. ► Desinfetar com lixívia os instrumentos de corte utilizados para aparar o buxo. ► Tentar regenerar as plantas atacadas, fazendo uma poda moderada.

Em Portugal não estão homologados fungicidas para tratamento desta grave doença. Ensaio recentes em Inglaterra e USA mostraram a eficácia de produtos à base de **boscalide+piraclostrobina**, **clortalonil**, **cresoxime-metilo**, **fludioxonil**, **miclobutanil**, **piraclostrobina**, **procloraz** e **propiconazol**. Ensaio da Estação Fitopatológica do Areeiro, em Pontevedra, mostraram a eficácia de produtos à base de **epoxiconazol**, **difenoconazol** e **cresoxime-metilo**.

ANTRACNOSE EM CICAS

***Heliconia* sp.**

Como **medidas preventivas**, recomenda-se que, ao regar estas plantas, **evite molhar as folhas**. Plante as cicas espaçadas, de modo a permitir uma **boa circulação do ar** entre elas. **Corte e queime as folhas afetadas** e irreversíveis.

Não estão homologados fungicidas para o combate a esta doença. No entanto, os ensaios mostraram a eficácia da aplicação preventiva de fungicidas à base de **cobre (hidróxido)**, **procloraz**, .



Folhas de Cycas com sintomas de antracnose

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2022

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S	Modo de ação
ametotradina (pirimidilamina) (QOSI)	ENERVIN SC (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural e mais de 2 tratamentos consecutivos	Não	35	Superfície –adesão ceras cuticulares/Preventivo
ametotradina + metirame (pirimidil amina+ ditiocarbamato) (QOS)	ENERVIN (BASF)				Superfície/Penetrante/ Preventivo / curativo fase inicial/ anti-esporulante
ametotradina + dimetomorfe (pirimidilamina-morfolina) (QOSI +CAA)	ORVEGO (BASF)				
amisulbrome (sulfonamida) QIL	LEIMAY (NISSAN CHEMICAL)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural		28	Superfície/ possui algum efeito translaminar /Preventivo/curativo quando aplicado logo após a infecção
	ZONGRUUM (NISSAN CHEMICAL)				
amisulbrome + folpete (sulfonamida+ftalamina) (Qil)	SANVINO (ADAMA)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural			
azoxistrobina (estrobilurina) (QOL)	AZAKA (CHEMINOVA)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural; ação simultânea Anti-Oídio; Black Rot e Escoriose		21	Penetrante com mobilidade Translaminar e lateral e sistemica via xilémica/ atividade essencialmente Preventiva e anti-esporulante, algum ação curativa
	AZBANY® PRO- (NUFARM L)				
	QUADRI (SYNGENTA)				
	IRIBIS (FMC)				
	SINSTAR (AGROLAC)				
azoxistrobina + folpete (estrobilurina+N tiotrihalometilo) QOL	QUADRI MAX (SYNGENTA) v	Não aplicar em uvas de mesa ,com exceção de **		28*	
	TAGUS F (SELECTIS)				
	TRUNFO F (SAPEC)				
benalaxil-M + folpete (fenilamina + N tiotrihalometilo)	FANTIC F (ISAGRO_SPA)	Não efetuar mais de 2 tratamentos por ciclo cultural		42	Superfície/ sistêmico/Preventivo/ curativo e anti-esporulante
	SAVIRAN STAR (ISAGRO_SPA)			42	
	SIDECAR F (ISAGRO_SPA)			42*	
	STADIO F (ISAGRO_SPA)				
bentiavalicarbe+cobre (sulf. Cobre tribásico) (amida+inorgânico) (CAA)	SOLLICIT (UPL)	Em videiras de uva de mesa, aplicações apenas até à floração. Não efetuar mais de 3 aplicações por ciclo cultural)		28	Penetrante com mobilidade translaminar/superfície / Preventivo/ Curativo
	VINTAGE DISPERSS (UPL IBERICA e GENIEN))				
ciazofamida (ciano-imidazol)+ Sufato dissódico (Organometálico) (QIL)	MILDICUT (ISK, BELCHIM)	Para proteção dos organismos do solo, não aplicar este produto mais do que uma vez por ano. Para evitar o desenvolvimento de resistências não efectuar mais que três tratamentos por ano com produtos do grupo Qil.)		21	Superfície /Penetrante /Sistêmico/ Preventivo
	KENKIO (BELCHIM)				
ciazofamida (ciano-imidazol) (QIL)	BRIONFLO® 100 SC (EUROTSA	Para evitar o desenvolvimento de resistências não efectuar mais que três tratamentos por ano com produtos do grupo dos Qil.		21	Superfície/Penetrante translaminar/ Preventivo
	NANAMID® 100 SC (MANICA)				
	SALVOR® (EUROTSA)				
	DARAMUN® (DIACHEM)				
ciazofamida (ciano-imidazol) + folpet (N-tiotrihalometilo) (QIL)	VIDERYO F (ISK)	Realizar no máximo 2 tratamentos por ano, com este produto. Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar produtos que contenham Qil, mais de 3 vezes por ano.		28*/70 **	
cimoxanil+cobre (oxicloreto) (acetamida + inorgânico)	CIMOFARM C (SAPEC)	Aplicarem em pós-floração , não aplicar mais de 4 kg/há/ano de cu		21	Penetrante translaminar/superfície / Preventivo e curativo
	VITIPEC C (SAPEC)				
	CIMONIL C (SELECTIS)				
	CURAME 25 WG (MANICA				
	SELVA (ADAMA)				
	VITIPEC C WG ADVANCE (SAPEC)				
cimoxanil+cobre (hidroxido de cobre) (acetamida + inorgânico)	COPFORCE EXTRA (AGRIA)	Não são permitidas aplicações manuais, trator cabinado		28	
cimoxanil+cobre (sulfato de cobre e cálcio) (acetamida + inorgânico)	INACOP PLUS BLU (IND. VALLES)	Aplicarem em pós-floração , não aplicar mais de 4 kg/há/ano de c			
	CUPERTINE SUPER (IND. VALLES)				
cimoxanil+folpete (acetamida +N-tiotrihalometilo)	TWINGO (SANGOSSE)	Realizar no máximo 1 tratamento. Em vinhas para produção de uvas de mesa, terá que ser posicionado antes da floração		28*/70 **	Penetrante/Superfície/ Preventivo e curativo, quando aplicado logo após a infecção
	MILITE (SELECTIS)	Realizar no máximo 3 tratamentos.		42*	
	MILITE AZUL (SELECTIS)	Apenas em uvas para vinificação			

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2022 (CONTINUAÇÃO I)					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S.	Modo de ação
cimoxanil+folpete (acetamida +N-tiotrihalometilo)	MILITE WG (SELECTIS)	Realizar no máximo 3 a 4 tratamentos. Com estes ou outros produtos com cimoxsnil Apenas em uvas para vinificação	Não	42*	Penetrante/Superfície/ Preventivo e curativo, quando aplicado logo após a infecção
	CIMORAME F (SELECTIS)				
	VITIEC AZUL (ASCENZA)				
cimoxanil+folpete+ fosetil-alumínio (acetamida+ftalimida +organometálico)	MAGMA TRIPLE WG (AFRASA)	Aplicar apenas com trator cabinado fechado		28	Superfície/Penetrante/ Sistêmico/ Preventivo e curativo
	VIDIVAL TRIPLE (AFRASA)				
	MILTRIPLO SUPER (AFRASA)			Em uva de mesa aplicar apenas até á floraçã	28
	KATANGA TRIPLO (PROPLAN)				
cimoxanil+folpete+ metalaxil (acetamida+ftalimida+fenilamida)	EKYP TRIO (ASCENZA)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano		42*/28 **	Penetrante /superfície/sistêmico/ Preventivo / curativo e anti-esporulante
cimoxanil+folpete+ metalaxil-M (acetamida+ ftalimida+fenilamida)	ACTLET EVO (SELECTIS)	Não fazer mais de 2 aplicações/ano, em uva de mesa apenas pode ser aplicado até á floração		28*	
	BOLTEX EVO (SELECTIS)				
cimoxanil+folpete+ tebuconazol (acetamida + ftalimida + trazol) (IBE-DMI)	VITIEC COMBI AZUL (ASCENZA)	Ação simultânea anti-oídio		42	Penetrante /superfície/sistêmico/ Preventivo / curativo
cimoxanil+fosetil-alumínio+cobre (oxicloreto) (acetamida+fosfanato+inorgânico)	VITENE TRIPLO R (SPICAM PORTUGAL)	Para evitar resistências, não efetuar mais de 4 aplicações/ ciclo cultural. Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado		40	Penetrante com ação translaminar/ sistêmico/Preventivo e curativo
cimoxanil+ metirame (acetamida + ditiocarbamato)	AVISOS DF (BASF)	Para evitar resistências , não efetuar mais de 3 aplicações por ciclo cultural		35	Penetrante com ação translaminar/ superfície/Preventivo e curativo (Quando aplicado logo após a infecção)
Cimoxanil +zoxamida (acetamida +benzamida)	DUOSTAR WG (BECESANE)			28	
	LIETO (			28	
	MILRAZ PRO (SIPCAM)			28	
cobre (oxicloreto) (inorgânico)	NEORAM MICRO (ISAGRO_SPA)	No conjunto dos tratamentos com produtos contendo cobre, não exceder a dosagem de 4 Kg de Cu/ha/ano Aplicação nos últimos 2 tratamentos, favorece o atempamento das varas	SIM	7	Fungicida de superfície/ Preventivo
	BLAURAME (IND_VALLÉS)			21	
	CUPRITAL (ASCENZA)			Não	
	CUPRITAL SC (ASCENZA)				
	CUPRAVIT (BAYER)				
	COBRE 50 SELECTIS (SELECTIS)				
	CURENOX 50 (IND_VALLÉS)				
	ULTRA COBRE (IND_VALLÉS)				
	EXTRA-COBRE 50 (IND_VALLÉS)				
	INACOP-L (INAGRA)				
	COBRE FLOW CAFFARO (ISAGRO_SPA)				
	FLOWRAM CAFFARO (ISAGRO_SPA)				
	CUPROCAFFARO WG (ISAGRO)				
	CUPROCOL (SYNGENTA)				
	FLOWBRIX (MONTANWERKE)				
	FLOWBRIX BLU (MONTANWERKE)				
	COZI 50 (VALLÉS)				
	OXITEC 25% HI BIO (AMBECHEM)				
	NUCOP M 35% HI BIO (AMBECHEM)				
	CUPROXI FLO (ADAMA)				
	COPPER KEY FLOW (KEY)				
	COBRE LAINCO				
	CUPRA (LAINCO)				
	CODIMUR 50 (SARABIA)				
	CODIMUR SC (SARABIA)				
	CUPROZIM 35 (SPIESS)				
	CUPROCOL (SYNGENTA)				
	OXICUPER (SELECTIS)				
	TRAXI 70 FLOW (BRANDT)				
MARIMBA 35 WG (BELCHIM)					
cobre (oxicloreto +sulfato de cobre)+benaxil-M (inorgânico fnilamida))	FANTIC A (ISAGRO)	Utilizar este produto após o aparecimento dos cachos		28*/40 **	Superfície/sistêmico/ Preventivo e curativo
cobre (oxicloreto de cobre)+dimetomorfe (inorgânico+morfolina) CAA	FORUM C (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural com este produto ou outros do grupo CAA	NÃO	21	Superfície/penetrante/ Preventivo e anti-esporulante
	SENADOR C (SELECTIS)			28	
	SPYRIT C (SAPEC)				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2022 (CONTINUAÇÃO II)					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S.	Modo de ação
cobre (oxicloreto de cobre)+ iprovalicarbe (inorgânico+carbamato) (CAA)	MELODY COBRE (BAYER)	Usar só após a floração; Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano	NÃO	21	Superfície/penetrante c/ propriedades sistêmicas/Preventivo , anti-esporulante e curativo quando aplicado imediatamente após a infecção.
cobre (oxicloreto de cobre)+ mandipropamida (inorgânico+mandelamida) (CAA)	AMPECIO C (SYNGENTA)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural com este ou outro produto do grupo CAA			
cobre (óxido cuproso) (inorgânico)	NORDOX® ENERGY (MASSÓ)	Máximo, 5 aplicações	SIM	21	Fungicida de superfície/ Preventivo
	COBRE NORDOX 75 WG (MASSÓ)	Máximo, 2 aplicações (2 últimos. tratamentos)		7	
cobre (hidróxido de cobre) (inorgânico)	KADOS (DUPONT)	Nunca aplicar durante a floração, se esta decorrer com tempo frio e chuvoso. Pode ter ação sobre geadas fracas, se aplicado antecipadamente. Não aplicar quando as condições são favoráveis à ocorrência de geadas fortes Não aplicar mais de 4 Kg de Cu/ha/ano	NÃO	7	
	KOCIDE 2000 (DUPONT)				
	KOCIDE 35 DF (DUPONT)		SIM		
	KOCIDE OPTI (DUPONT)				
	CHAMPION WP (NUFARM_P)		Não		
	CHAMPION FLOW (NUFARM_P)				
	COPERNICO 25% HIBIO (AMBECHEM)		SIM		
	HIDROTEC 20 % HI BIO (ALBTKI))				
	HIDROTEC 50% WP (SELECTIS)				
	CHAMPION DP (NUFARM_P)				
cobre (hidróxido+ oxicloreto de cobre (inorgânico)	HIDROCUPER WG (SELECTIS)	Não aplicar mais de 4 Kg de Cu/ha/ano, no conjunto dos produtos com cobre			
	MAXI COPPER WG (ASCENZA)				
cobre (hidróxido+ oxicloreto de cobre (inorgânico)	GRIFON (ISAGRO)	Não aplicar mais de 4 Kg de Cu/ha/ano, no conjunto dos produtos com cobre			
	CUPRANTOL DUO (ISAGRO)				
cobre (hidróxido+ oxicloreto de cobre) + benaxil M (inorgânico+ fenilamia)	FANTIC A (ISAGRO)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural	NÃO	28*/40**	Superfície/ sistêmico/Preventivo/ curativo e anti-esporulante
cobre (hidróxido+ oxicloreto de cobre) + valifenalato (inorgânico+ valinamida carbamatos (CAA)	GORILL PLUS (Belchim)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural		28	Superfície/ movimento translaminar, penetrante e de difusão /Preventivo/ curativo/anti-esporulante
	VALIS PLUS (BELCHIM)				
cobre (hidróxido)+ dimetomorfe (inorgânico + morfolina) CAA	SPHINX PLUS (ADAMA)	Não fazer mais de 3 a 4 aplicações por ciclo cultural		56	Sistêmico/Preventivo e curativo e anti-esporulante
	SPYRIT COPPER (ASCENZA)				
	SENADOR HC (SELECTIS)				
cobre (hidróxido)+ metalaxil (inorgânico + fenilamida)	CYCLO R-líquido (EPAGRO)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural	20		
cobre (oxicloreto de cobre)+ metalaxil-M (inorgânico+ fenilamida)	RIDOMIL GOLD R WG (SYNGENTA)				
cobre (sulfato de cobre tribásico) (inorgânico)	NOVICURE (UPL)	Realizar no máximo 5 aplicações no mesmo solo agrícola, com este produto não excedendo 4 Kg de cobre/ha/ano no conjunto dos produtos que contenham cobre	SIM	21	Superfície/ Preventivo
	CUPROXAT (NUFARM_P)	Nunca aplicar durante a floração se esta decorrer com tempo frio e chuvoso.		7	
cobre (sulfato de cobre tribásico)+ fosetil (sal alumínio) (inorganico + organofosfonato))	OPTIX R (UPL)	Aplicar o Optix R preventivamente a partir da floração.	NÃO	28	Superfície/Sistêmico/P reventivo
cobre (sulfato de cobre tribásico)+ zoxamida (inorgânico + benzamida)	AMALINE FLOW (NUFARM_P)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano. Não aplicar durante a floração		28	Superfície e penetrante/ Preventivo
cobre (sulfato cobre e cálcio – mistura bordalesa) (inorgânico)	MANIFLOW (MANICA)	Não aplicar durante a floração, com tempo frio e chuvoso	SIM	21	Superfície/ Preventivo
	SUPER BORDALESA (UPLCOOP)			21	
	MANIFLOW (MANICA)		Não	7	
	CALDA BORDALESA ASCENZA				
	CALDA BORDALESA QUIMIGAL (VALLÉS)		SIM	21	
	CALDA BORDALESA RSR (CEREXAGRI)				
	CALDA BORDALESA QUIMAGRO		Não	7	
	CALDA BORDALESA SELECTIS				
	BORDALESA SELECTIS 124 SC		SIM	7	
	CALDA BORDALESA CAFFARO 20				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2022 (CONTINUAÇÃO III)					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S.	Modo de ação
cobre (sulfato cobre e cálcio – mistura bordalesa) (inorgânico)	CALDA BORDALESA AZUL (VALLÉS)	Não aplicar durante a floração, com tempo frio e chuvoso	SIM	7	Superfície/Preventivo
	CALDA BORDALESA VÁLLES				
cobre (sulfato cobre e cálcio mistura bordalesa)+ cimoxanil (inorgânico+acetamida)	INACOP PLUS BLUE (VALLÉS	Não fazer mais de 4 aplicações em cada ano	NÃO	21	Superfície/penetrante/ preventivo e curativo
	CURAME POLTIGLIA			20	
cobre (oxicloreto de cobre)+ fosetil de alumínio+cimoxanil (inorgânico+organometálico + acetamina)	VITENE TRIPLO R (SIPCAMOX)	Não fazer mais de 4 aplicações /ciclo cultural Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado	Não	40	Penetrante/sistémico e de contacto com actividade preventiva e curativa
cobre (hidróxido de cobre) + metalaxil M (inorgânico+ fenilamia)	ACTLET C (ASCENZA)	Realizar no máximo 2 tratamentos anuais, no conjunto das doenças, com este ou outros fungicidas do grupo das fenilamidas. Utilizar no período de maior pressão de míldio (G/I), não aplicar após a fase “Bago grão de chumbo.”		28	Superfície/ sistémico/Preventivo/ curativo e anti-esporulante
	BOLTEX C (SELECTIS)				
	CYCLO MAX SC (AFRASA)				
Cos-oga (Extratos de plantas /crustáceos)	(FYTOSAVE (FYTOFEND)	Nº máximo de aplicações -8, aplicação antes do aparecimento da doença	SIM	3	Preventivo/ativador das defesas naturais das plantas
Ditianão +fosfanato de potássio (quinona + fosfanato)	ENVITA (BASF)	Não fazer mais de 4 aplicações/ ano, apenas em uvas para vinificação	NÃO	42*	Superfície/Sistémico/ Preventivo/Estimula a defesa natural das plantas
dimetomorfe (morfolina) (CAA)	SPHINX (ADAMA)	Não efetuar mais de 3 a 4 aplicações/ano		10	Penetrante, sistemía localizada /Preventivo/ anti-esporulante
dimetomorfe (morfolina)+ Cobre - oxicloreto(inorgânico) CAA	FORUM® C (BASF)	Tratamentos pós-florais (Max 4 tratamentos		21	
dimetomorfe+ditianão (morfolina+quinona) CAA	FORUM GOLD (BASF)	Não efetuar mais de 3 a aplicações/ano		35	
dimetomorfe + folpete (morfolina+N-tiotrihalometilo) (CAA)	DIFOMIL WG (SHARDA)	Dependendo do produto, não efetuar mais de 3 a 4 aplicações/ano Alguns dos produtos contendo folpete não podem ser aplicados em uva de mesa, ou apenas até à floração*** (consultar rótulo)		40*	
	FORUM F (BASF)			42*	
	BACO WG (NUFARM PORTUGAL)			40*	
	METOMOR F (SHARDA COPROCHEM)			40*	
	SENADOR F (SELECTIS)			42*/**	
	SPYRIT F(ASCENZA)			42*/*	
	VINOSTAR (ADAMA)			42*	
dimetomorfe+metirame (morfolina + (ditiocarbamato) (CAA)	SLOGAN TOP (BASF)	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 3 tratamentos, por ciclo cultural, com este ou outro produto que contenha CAA.		35	Penetrante, sistemía localizada /Preventivo/ anti-esporulante
	ACROBAT TOP (BASF)			35	
dimetomorfe +piraclostrobina (morfolina +estrobilurina) (CAA+QOL)	CABRIO TEAM (BASF)	Não fazer mais de 1 aplicação no conjunto das doenças a tratar / ano. Combate simultaneamente o oídio, apenas para uva de mesa		35**	Penetrante com mobilidade translaminar/Preventivo/ Curativo/ anti-esporulante
dimetomorfe+zoxamida (morfolina + benzamida) (CAA)	PRESIDIUM (GOWANL)	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 3 tratamentos, por ciclo cultural, com este ou outro produto que contenha CAA.. O folpete em uva de mesa apenas pode ser usado até à floração		28	Penetrante, sistemía localizada /Preventivo / anti-esporulante
dimetomorfe+folpete (morfolina + ftalimida) (CAA)	SENADOR F (SELECTIS)			42	
	SPYRIT F (ASCENZA)				
	VINOSTAR (ADAMA)				
dimetomorfe+folpete+ Fosetil de alumínio (morfolina +ftalimida+organometálico) (CAA)	BELVITIS (SELECTIS)	Utilizar este produto em uvas para vinificação, apenas desde a floração até ao início do fecho dos cachos. máximo 3 aplicações		28*	Penetrante, sistemía localizada /Sistémico (ativa defesas naturais das plantas)/Preventivo/anti-esporulante
	VINO GUARD (ASCENZA)				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO **MÍLDIO** DA VIDEIRA EM 2022 (CONTINUAÇÃO IV)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S.	Modo de ação	
Folpete (ftalimida)	FLEXI 80 WG (SHARDA)	Alguns fungicidas com a s. ativa folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa; ou apenas podem ser utilizados até à floração*** (Consultar rótulo do produto)		28*	Superfície/Preventivo	
	FOLLOW 80 (SHARDA/NUFARMA)			28*		
	FOLPETIS (SELECTIS)			28*		
	FOLPETIS SC (SELECTIS)			34		
	FOLPETIS WG (SELECTIS)			42		
	FOLPAN 80 WDG (ADAMA)			28*		
	FOL-HITEC(SHARDA)			34*		
	FOLPEC 50 (SAPEC)			28*		
	FOLPEC 50 SC (ASCENSA)			34*		
	FOLPEC 50 AZUL (SAPEC)			28*		
	FOLLET 80 WG (SHARDA)			28*		
	FOLPEC 80 WG (ASCENZA)			42*/56**		
	FLOVINE (ADAMA)			42*/**56		
	FOLMAK			42*		
	VIDEVAL VALLÉS					
folpete+fosetil (sal alumínio) (ftalimida + organofosfonato)	RHODAX FLASH (BAYER)			42*	Superfície/Sistémico/ Preventivo/ Ligeira ação curativa	
	MAESTRO F (SAPEC)					
	MAESTRO F AZUL (ASCENZA)					
	MAESTRO F WG ADVANCE (ASCENZA)					
	ZETYL COMBI AZUL (ASCENZA)					
	ZETIL COMBI (SELECTIS)					
	ZETIL COMBI WG (SELECTIS)					
folpete+fosetil-alumínio+iprovalicarbe (CAA) (ftalimida+organometálico+amida)	MELODY SUPER (BAYER)	Não realizar mais de 3 tratamentos por campanha, com estes ou outros fungicidas, contendo CAA. O folpete em vinhas para produção de uvas de mesa; não pode ser utilizado, ou apenas é permitida a sua utilização até à floração. Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural		42*	Superfície/penetrante/ Sistémico/ Preventivo/ Curativo e antiesporulante	
	folpete+iprovalicarbe (ftalimida+carbamato) (CAA)			MELODY (BAYER)	42	É um fungicida de superfície e sistémico e tem actividade preventiva e curativa
folpete+mandipropamida (ftalimida + mandelamida) (CAA)				MANDATÓRIO F (SYNGENTA)	28*	Superfície/penetrante /preventivo/ e anti-esporulante
				PERGADO F (SYNGENTA)	28*	
folpete+metalaxil (ftalimida + fenilamida)	EKYP COMBI (ASCENZA)			Alguns fungicidas que contenham folpete em produção de uvas de mesa; apenas podem ser aplicados até à floração Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural		42*/28**
	EKYP COMBI AZUL (ASCENZA)					
	ARMETIL 50 (VALLÉS)	28*/56**				
	MEVAXIL COMBI (VALLÉS)	28**/42*				
	FOLPAXIL AZUL (SELECTIS)					
folpete+metalaxil-M (ftalimida + fenilamida)	CYCLO M PLUS (AFRASA)	Em uva de mesa, aplicações apenas até à floração**, não efetuar mais de 2 aplicações por ciclo cultural		28*/**	Superfície /Sistémico/ Preventivo/ Curativo e anti-esporulante	
	BOLTEX F (SELECTIS)			28		
	ACTLET F (ASCENZA)					
	MILDOR COMBI F (AGCHEML)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural. Em vinhas para produção de uvas de mesa, Alguns produtos com folpete não podem ser aplicados, (Ver rótulo)		42*		
	FOLPAN GOLD (ADAMA)					
	RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (SYNGENTA)					
folpete+ oxatiapiprolina (ftalimida + piperidinil-tiazol-oxatia) (OSBP)	ZORVEC™ VINABRIA™ (CORTEVA)	Não fazer mais de 2 aplicações		56	Superfície/movimento sistémico, translaminar e ascendente via xilema / Preventivo/ Curativo	
	folpete+ piraclostrobina (caa) (ftalimida + estrobilurina)	CABRIO STAR (BASF)	Não fazer mais de 2 aplicações consecutivas e 3 aplicações no total. Controla simultaneamente oídio e Black rot		42*	Superfície/Penetrante translaminar/Preventivo/ curativo

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO **MÍLDIO** DA VIDEIRA EM 2022 (CONTINUAÇÃO V)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S.	Modo de ação
folpete+valifenalato (caa) (ftalimida + amidas ac)	VALIS F (BELCHIM)	Não fazer mais de 3 aplicações	NÃO	28*/70**	Superfície/Sistémico - mobilidade translaminar /Preventivo/ curativo
folpete+valifenalato (caa) (ftalimida + amidas ac)	JAVA F (BELCHIM)	Não fazer mais de 3 aplicações		28*/**70	Superfície/Sistémico - mobilidade translaminar /Preventivo/ curativo
	EMENDO F (BELCHIM)				
fosetil (sal de alumínio) (organometálico)	FOSAL 80 WG (CHEMINOVA)	Realizar no máximo 3 tratamentos com estes produtos e 4 no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura.		28	Sistémico (ativa defesas naturais das plantas e com alguma ação sobre o patogenio)/Preventivo
	FOSKEY WG (KEY)				
	KEYFOL WG (KEY)				
	KEYFOL WP (KEY)				
	KILATE WG (LAINKO)				
	KILATE (LAINKO)				
	GOLBEX WG (SARABIA)				
	GOLBEX WP (SARABIA)				
	FOSPROBEL 80 WG (PROBELTE)				
	ALIAL 80 WG (FMC)				
GOLBEX WG (SARABIA)					
fosetil (sal de alumínio) (organometálico) + folpete (ftalimida) + cimoxanil+ (acetamida)	VITIPPEC GOLD (AFRASA)	Aplicação apenas com trator cabinado. Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto e 4 no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio		28	Superfície/Penetrante/ Sistémico/ Preventivo e curativo
fosfanatos dissódio (fosfanato)	CERAXEL (BELCHIM)	Máximo de 3 aplicações /ciclo cultural com este produto e 4 no conjunto de aplicações com fosetil e fosfato dissódico)	21	Sistémico/ preventivo/Estimula a defesa natural das plantas	
	REDILI (BELCHIM)				
fosfanatos de potássio (fosfanato)	MIKONOS (LAINCO)		Máximo 5 aplicações /ciclo cultural-Dose máxima /ha é de 4L		15
	PHYTO SARCAN (EXSA)				
	KERALA (EXSA)				
	SAVIAL FORTE (LAINKO)				
	MILDFOS (BIOVERT)				
	CUNEB (LAINCO)				
	FOSIKA (BIOVERT)				
	ALEXIN 75 LS (LUX)				
SORIALE (LUX)	14				
fosfanatos de potássio (fosfanato+ametoctradina (pirimidilamina) (QOSI)	ENERVIM® PRO PACK (BASF)	Pack contendo 3L de Enervin® SC e 4L de Soriale®.	35	Superfície –adesão ceras cuticulares/ Sistémico/ preventivo/Estimula a defesa natural das plantas	
Fluopicolida (benzamida) + fosetil (sal de alumínio) (organometálico)	PROFILER (BAYER)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural	28	Penetrante translaminar /sistémico / estimula as defesas naturais das plantas. Preventivo, curativo e anti-esporulante.	
Fluaziname (dinitroanilina)	TIZCA (FMC)	Aplicar o produto sempre em mistura com fungicidas anti-míldio sistémicos ou penetrantes. Não efetuar mais de uma aplicação por ciclo cultural para o conjunto das doenças a tratar. Tem simultaneamente ação sobre a botrytis-	28*	Superfície /Preventivo	

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2022 (CONCLUSÃO VI)					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S.	Modo de ação
mandipropamida+ zoxamida (mandelamida+benzamida) (CAA)	AMPEXIO (SYNGENTA)	Realizar no máximo 3 tratamentos, posicionados até ao pintor, com este produto ou outros fungicidas que contenham CAA e zoxamida	NÃO	21	Penetrante na camada cerosa/Preventivo/ Curativo quando aplicado logo após a infeção / anti-esporulante
metirame (ditiocarbamato)	POLYRAM DF (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural		28	Superf./Preventivo
Metalaxil (fenilamida)	ARMETIL 25WP (IQV)	Para evitar resistências ,não fazer mais de 2 aplicações em cada ano		14	sistémico com , atividade residual e preventiva
metirame+ piraclostrobina (ditiocarbamato+ metoxi-carbamato) (QOL)	CABRIO TOP (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural Ação simultânea anti-oidio, Escoriose e Black rot		56	Superf./penetrante Translaminar/ Preventivo/ Curativo
metirame+ dimetomorfe (ditiocarbamato+ morfolina) (CAA)	SLOGAN TOP (BASF)	Não efetuar mais de 3 aplicações com este ou outros produtos do grupo CAA		35	/Penetrante/Preventivo / anti-esporulante
Oxatiapiprolina (piperidinyl-thiazole-isoxazoline) (OSBP)	ORONDIS (CORTEVA)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano		14	Movimento sistémico ascendente via xilema/Translaminar e / Preventivo/ Curativo
	ZORVEC™ZELAVIN™ (CORTEVA))				
Oxatiapiprolina (piperidinyl-thiazole-isoxazoline) + zoxamida (benzamida) (OSBP)	PACK (ZORVEC™ZELAVIN™ + ZOXIUM 240 SC				
piraclostrobina (estrobilurina) (QOL)	CABRIO (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural Ação simultânea anti-oidio		35	Penetrante Translaminar/ Preventivo /Curativo
óleo de laranja	PREV-AM® (OAEU)	Não fazer mais de 6 aplicações por ciclo cultural Previne simultaneamente o Oídio e Botrytis		1	Preventivo/Contato
	PREV-AM® PLUS (OAEU)				
	PREV-AM® ULTRS (OAEU				
	ORACIDE® (OROAGRI)				
	LIMOCIDE J (VIVAGRO)				
Cerevisana	ROMEO (AGRO-LEVURES)	É um produto composto por paredes celulares da levedura Saccharomyces cerevisiae estirpe LAS 117 Realizar no máximo 10 tratamentos por ano. Trata simultaneamente o oídio e a podridão cinzenta	SIM		Indutor da resistência das plantas/Preventivo
	ACTILEAF (AGX)				
zoxamida (benzamida)	ZOXIUM 240 SC (GCP)	Não fazer mais de 5 aplicações por ciclo cultural, até 3 consecutivos	NÃO	28	Penetra rapidamente nas ceras cuticulares das folhas e dos bagos / Preventivo

Estação de Avisos de Entre Douro e Minho

Fonte: [SIFITO.DGAV.PT](#) (consultada em 16/02/2022)

NOTAS: MPB. – Modo de Produção Biológico; **I.S.** – Intervalo de segurança (Dias), (*Uva vinificação/**Uva de mesa,***Aplicado apenas até á floração em Uvas de mesa)

A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo e/ou Ficha Técnica dos produtos.

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO NEGRA (BLACK-ROT) DA VIDEIRA EM 2022

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação		
azoxistrobina (estrobilurina) (QoI)	QUADRIIS (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; combate simultaneamente o míldio, escoriose e o oídio	NÃO	21	Penetrante com mobilidade translaminar e lateral/ Preventivo/ Anti-esporulante e com alguma atividade curativa		
azoxistrobina+folpete (estrobilurina + ftalimida) (QoI)	QUADRIIS MAX (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; combate simultaneamente o míldio e o oídio; Não aplicar em videiras de uva de mesa		28*	Superfície/ Penetrante com mobilidade translaminar e lateral/ Preventivo/ Anti-esporulante e com alguma atividade curativa		
	TAGUS F (SELETIS)						
	TRUNFO F (ASCENZA)						
cimoxanil + metirame (acetamida + ditiocarbamato)	AVISO DF (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano com este ou outro produto do grupo de ação.		35	Superfície/ penetrante translaminar/ Preventivo/Curativo/		
cobre (hidróxido + oxicloreto) (inorgânico)	GRIFON (ISAGRO)	Não ultrapassar a dosagem de 4 KG de cobre/ha/ano no mesmo solo agrícola	SIM	21	Superfície/preventivo		
	CUPRANTOL DUO (ISAGRO)						
cresoxime-metilo (estrobilurina) (QoI)	DECIBEL (SELECTIS)	Não efetuar mais de 2/3 tratamentos (mais de 2 consecutivos), por ano e no total das doenças; combate simultaneamente o oídio	Não	35	Penetrante- Translaminar e ação de vapor/ .Preventivo/ curativo/ anti-esporulante		
	STROBY WG (BASF)			42*/35**			
	SUGOBY (LAINCO)			35			
	KSAR (ASCENZA)						
	VALKROM (AFRASA)						
	QUIMERA (EPAGRO)						
cresoxime-metilo+penconazol (estrobilurina + triazol) (QoI/IBE-DMI)	ARRIOSTA (SELECTIS)			80*/35**			
	KSAR VITIS (ASCENZA)			35*			
difenconazol (triazol) (IBE-DMI)	SCORE 250 EC (SYNGENTA)			Não efetuar mais de 2 a 3 tratamentos, por ano com este ou outro produto do grupo dos DMI, no conjunto das doenças/ano (consultar rótulo)		21	Penetrante com Sistemias localizada/Translaminar / .Preventivo/ curativo
	MAVITA 250 EC (ADAMA)						
	ZANOL (AGCHEM)						
	INVICTUS (SELETIS)						
	CERIMONIA (ASCENZA)						
difenconazol+espiroxamina(triazol+spirocetalamidas) (IBE-DMI)	SPiROX D (ARISTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano. Combate simultaneamente o oídio.em uva de mesa deve ser apenas usado até ao final da floração	35	Penetrante com Sistemias localizada/Translaminar /Sistémico/ .Preventivo/ curativo e erradicante			
Ditianão + fosfanato de potássio (quinonas + ácido fosfórico)	ENVITA (BASF)	Realizar no máximo 4 aplicações por campanha, previne simultaneamente míldio e escoriose	42	Preventivo/superfície/si sitémico com ação preventiva			
fenebuconazol (triazol) (IBE-DMI)	INDAR 5 EW (DOW LUSSEM)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano com este ou outro DMI, no conjunto das doenças; combate simultaneamente o oídio	28	Penetrante com Sistemias ascendente/ Preventivo /Curativo			
	IMPALA (IQU AGRO)						
folpete (ftalimida)	FOL-HITEC (AGGCHEM)	Não efetuar mais de 8 aplicações por ano. Fungicidas que contenham folpet na sua composição, não poderão ser utilizados em uvas de mas*, ou em alguns casos apenas até à floração (consultar o rótulo) Atua simultaneamente no combate ao míldio, escoriose e podridão cinzenta.		Superfície/ Preventivo			
	FLEXI 80 WG (SHARDA))						
	FOLLET 80 WG (SHARDA)						
	FOLPEC 80 WG (ASCENZA						
	FOLPETIS (SELECTIS)						
	FOLLOW 80 WG (SHARDA)						
Folpet + Piraclostrobina (ftilamina+estrobilurina) (QoI)	CABRIO STAR (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano com este ou outro QoI, no conjunto das doenças.; combate simultaneamente o oídio e míldio. Não efetuar mais que dois tratamentos consecutivos		42*	Superfície/penetrante translaminar/Preventivo / curativo.		
Mefentrifluconazol - Triazol (IBE-DMI))	REVYSION (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos			21	Penetrante , com MobilidadeTranslaminar e sistémica. Preventivo/curativo	

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO NEGRA (BLACK-ROT) DA VIDEIRA EM 2022

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação	
metirame+piraclostrobina (ditiocarbamato + estrobilurina)	CABRIO TOP (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos por ano; combate simultaneamente o míldio, o oídio e a escoriose		56	Superfície/ Penetrante com mobilidade translaminar Preventivo/ Curativo	
miclobutanil (triazol (IBE-DMI))	SELECTANE (INDOFIL)	Não efetuar mais de 3 tratamentos por ciclo cultural, Trata simultaneamente o oídio		15	Penetrante com Sistemias ascendente/ Preventivo /Curativo	
	SYSTHANE ECOZOME (LUSOSEM)					
	RALLY PLUS (DOW AGRO.)					
	SYSTHANE STAR (DOW AGRO.)					
	LICORNE (DOW)					
	MISHA 20 EW (SHARDA / NUFARM)					
miclobutanil + nafta de petróleo (triazol+óleo mineral)	BRIK 20 EW (C.Q.MASSÓ SA)			14		
	MICLOTOP 20EW (SHARDA)					
miclobutanil (triazol) + 1,2-Benziosotiazol -3(2H)-ONA	SYSTHANE 25 (DAS IBER)					
Tebuconazol (triazol)	KADIMA (ROTAM)	Não efetuar mais de 3 tratamentos por ano; combate simultaneamente, o oídio		14	Movimento sistémico/ penetrante/Preventivo /Curativo	
	DIVINUS (ROTAM)					
	UIISSES (JOVAGRO)					
tebuconazol+trifloxistrobina (triazol + estrobilurina) (IBE-DMI+Qol)	FLINT MAX (BAYER)	Não efetuar mais de 3 tratamentos., tem ação simultânea anti-oídio		35	Movimento sistémico /Penetrante com mobilidade translaminar e lateral e ação de vaporl/ Preventivo/curativo/	
trifloxistrobina (estrobilurina)	CONSIST (BAYER)	; Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; combate simultaneamente o oídio.				Penetrante com mobilidade translaminar e lateral e ação de vaporl/ Preventivo/curativo/
	SAFIRA (GLOQUIM)					
	FLINT (Bayer)					

Estação de Avisos de Entre Douro e Minho

Fonte: sifito.dgav.pt (consulta em 10/02/2022)

LEGENDA: [MPB](#) – Modo de produção biológico; **I.S.** – Intervalo de segurança *uvas para vinificação/**Uvas de mesa

A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo/Ficha Técnica dos produtos.

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO OÍDIO DA VIDEIRA EM 2022					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação
azoxistrobina (estrobilurina) (Qol)	QUADRI (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; Proteção simultânea contra o míldio e o black rot	NÃO	21	Penetrante c/ mobilidade Translaminar e lateral/ Preventivo/ /anti-esporulante e alguma atividade Curativo
	SINSTAR (AGROLAC)				
	IRIBIS (FMC)				
	AZAKA(FMC)				
	AZBANY PRO (NUFARM)				
azoxistrobina+ folpete (estrobilurina + ftalimida) (Qol)	QUADRI MAX (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; Proteção simultânea contra o míldio e Black Rot. Não aplicar em videiras de uva de mesa	NÃO	28*	Superfície/Penetrante c/ mobilidade Translaminar e lateral/ Preventivo/ /anti-esporulante e alguma atividade Curativa
	TAGUS F (SELECTIS)				
	TRIUNFO F (SAPEC)				
azoxistrobina+ tebuconazol (estrobilurina + triazol) (Qol+IBE-DMI)	CUSTODIA (ADAMA)	Não efetuar mais de 2 tratamentos, por ano e no total das doenças, com este ou outro fungicida do mesmo grupo.	NÃO	21	Penetrante c/ mobilidade Translaminar, lateral/e sistêmica/Preventivo/ Curativo e anti- esporulante
boscalide+cresoxime-metilo (carboximida+estrobilurina) (SDHI-Qol)	COLLIS (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças, com este ou outro fungicida do mesmo grupo. Apenas 2 tratamentos consecutivos		28	Sistêmico / Penetrante, com mobilidade translaminar e ação de vapor/ Preventivo/curativo/ant i-esporulante
Calda sulfo-cálcica (óxido de cálcio (da cal virgem) + enxofre (inorgânico))	CURATIO (BIOFA)	Realizar 1 tratamento em pré-floração, 1 durante a floração e os restantes depois da floração. Aplicar no máximo 12 L/há no total das aplicações (Max. 5)	Sim	30	Superfície (Atua por contato e libertação de vapores)/ Preventivo/curativ
ciflufenamida (fenil-acetamida)	CIDELY (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 2 tratamentos, por ano e no total das doenças, com este ou outro fungicida do mesmo grupo	Não	21	Penetrante, com mobilidade translaminar e ação de vapor. Atividade preventiva e curativa
	NISSODIUM (NISSO)				
	CYFLAMID (SIPCAM_P)				Penetrante, com mobilidade translaminar e ação de vapor/ Atividade preventiva e curativa e anti-esporulante
ciflufenamida+difenoconazol (fenil-acetamida + triazol) (IBE-DMI)	DYNALI (SYNGENTA)				
cimoxanil+folpete+ tebuconazol (acetamida+ftalimida+ Triazol) (IBE-DMI)	VITIPEC COMBI AZUL (HELM AG)	Máximo de 3 aplicações, combate simultaneamente míldio e oídio. Não aplicar em videiras de uva de mesa	Não	42*	Superfície /Penetrante/ com movimento sistêmico/ Preventivo/curativo
cresoxime-metilo (estrobilurina) (Qol)	STROBY WG (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças. Combate simultaneamente o black rot		42*/35**	Penetrante c/ mobilidade Translaminar e lateral/ Preventivo/ anti-esporulante e algum poder curativo
	SUGOBY (LAINCO)				
	KSAR (ASCENZA)				
	DECIBEL (SELECTIS)				
	QUIMERA (EPAGRO)				
	VALKROM (IQV Agro PT)				
ARRIOSTA (SELECTIS)	80*/35**			Penetrante c/ mobilidade Translaminar e sistêmica e lateral/ /Preventivo/ Curativo e anti- esporulante	
cresoxime-metilo+penconazol (estrobilurina+ triazol) (Qol+IBE-DMI)					KSAR VITIS (ASCENZA)
difenoconazol (triazol) (IBE-DMI)	SCORE 250 EC (SELECTIS)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças. Com este ou outros fungicidas do grupo DMI	NÃO	21	Mobilidade translaminar/Preventiv o/curativo / anti- esporulante
	INVICTUS (SELECTIS)				
	CERIMÓNIA (ASCENZA)				
	MAVITA 250 EC (SYNGENTA)				
	ZANOL (AGROTOTAL)				
Dimetomorfe (morfolina) + piraclostrobina (estrobilurinas) (CAA/QoL)	CABRIO TEAM	Apenas para aplicar em uva de mesa, até ao fim da floraçã	NÃO	**	

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO ÓÍDIO DA VIDEIRA EM 2022 (CONTINUAÇÃO I)						
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação	
Enxofre (inorgânico)	KUMULUS S (BASF)	A usar no período pré-floral. Depois da floração, apenas em vinha em ramada ou videiras de castas pouco suscetíveis ao oídio. O uso das concentrações mais elevadas pode dar origem a fitotoxicidade. Respeitar o período de 3 semanas entre a aplicação de uma calda oleosa, e produtos que contenham enxofre.	SIM		Atua por contato e libertação de vapores/ Preventivo/ curativo	
	ENXOFRE DIAMANTE PALLAÉS (GENYEN)					
	THIOVIT JET (SYNGENTA)					
	ENXOFRE MOLHÁVEL SELECTIS					
	NIMBUS (IQV AGRO PT)					
	ALASCA MICRO (SELECTIS)					
	BAGO DE OURO 98,5% (ASCENZA)	Nº máximo de aplicações -3				
	FLOSUL (SULPHUR)	Em condições favoráveis e em vinhas de castas reconhecidas localmente como muito sensíveis ao oídio, usar apenas no período pré-floral.				
	FLOR DE OURO 98,5% (SELECTIS)					
	MICROTHIOL SPECIAL DISPERS (EPAGRO)	Nº máximo de aplicações -8				
	SOUF PALLARÉS 80 WG (GENYEN)	Nº máximo de aplicações- 1				
	ENXOFRE MOLHÁVEL ORMENTAL (SPICAM)	Em vinhas muito sensíveis usar apenas em pré-floração				
	THIOPRON 825 (UPL EUROPE)	Nº máximo de aplicações -8				
	COSAN WDG (UPL)	Em vinhas muito sensíveis usar apenas em pré-floração				
	COSAVET DF (SULPHUR)	Nº máximo de aplicações -8		28		
	COSAN 80 WG (UPL)	Nº máximo de aplicações -8		5		
	NIMBUS 80 WG (UPL)	Nº máximo de aplicações -8				
	MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDO (EPAGRO)	Nº máximo de aplicações -8				
	ZAPPY DP (SML)					
	STULLN FL (SAPEC)	Em vinhas muito sensíveis usar apenas em pré-floração				
	STULLN (SAPEC)					
	ENXOFRE MICRONIZADO PREMIER (AGROTOTAL)	Nº máximo de aplicações -1				
	ENXOFRE PALLARES 95 DP (AZUFERA)	Nº máximo de aplicações -5				
	ENXOFRE F EXTRA (AZUFRERA)	Nº máximo de aplicações -3				
	COLPENN (UPL)	Nº máximo de aplicações -8, usar apenas em Ramadas após a floração				
	ENXOFRE DIAMANTE SUBLIMADO (QUALFOOD)	Nº máximo de aplicações -8				
	HELIOTERPEN SOUFRE (ACT PIN)	Nº máximo de aplicações -12				
	HELIOSOUFRE S(ACT PIN)					
	ENXOFRE DIAMANTE UV (AFEPASA)	Nº máximo de aplicações -4				
	SOLFOXIDANTE (GENYEN)	Nº máximo de aplicações -4				
	SULFOMAX 80 SC (AFEPASA)	Nº máximo de aplicações -8		5		
	SOFREX (UPL)	Nº máximo de aplicações -8				
	ALASKA MICRO (SELECTIS)	Em vinhas muito sensíveis usar apenas em pré-floração		5		
	SUFREVIT (INAGRA)					
	AZUFEGA (AJF)	Nº máximo de aplicações -5		1		
	AZUFEGA 80 P (AJF)	Nº máximo de aplicações -5		5		
	AZUFEGA 80 LA (AJF)	Nº máximo de aplicações -6		1		
	AZUFEGA DISPERS WG(AJF)	Nº máximo de aplicações -4		1		
	AZUFEGA OXIDANTE (AJF)	Nº máximo de aplicações -4		1		
	RIOSUL OXIDANTE (AJF)	Nº máximo de aplicações -4		1		
	RIOSUL 80 (AJF)	Nº máximo de aplicações -5		5		
	RIOSUL (AJF)	Nº máximo de aplicações -5		1		
	ACOIDAL WG (QUIMETAL)	Nº máximo de aplicações -8		5		
	ENXOFRE BAYER WG (UPL)			NÃO		
	STULLN AG ADVANCE (ASCENZA)					
	LAINXOFRE L (LAINCO)	Em vinhas muito sensíveis usar apenas em pré-floração				
espiroxamina (morfolina) IBE	PROSPER (BAYER)	Não efetuar mais de 2 tratamentos, por cultura/ ano com este ou outro produto que contenha DMI ou espiroxamina	NÃO	5*/14**	Sistémico (mobilidade ascendente)/Preventivo /curativo/Anti-Esporulante	
	SPIROSTAR (ARYSTA)			35		
	SPIROX (ARYSTA)			35*/14**		

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO OÍDIO DA VIDEIRA EM 2022 (CONTINUAÇÃO II)					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S.	Designação comercial
espiroxamina + difenoconazol (morfolina+ triazol) (IBE)	SPIROX D (ARYSTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por cultura/ ano com este ou outro produto que contenha DMI ou espiroxamina. Em uva de mesa aplicações apenas até à floração	NÃO	35*	Sistémico /mobilidade translaminar/Preventivo/curativo e anti-esporulante
fenebuconazol (Triazol) (IBE-DMI)	INDAR 5 EW (DOW- LUSOSEM)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças. Controla simultaneamente Black Rot.		28	Penetrante com Movimento Sistémico/ / Preventivo/ Curativo
	IMPALA (IQV AGRO PT)				
Flutianil (tiazolidina)	GATTEN (OAT Agrio Co., Ltd)	Realizar no máximo 2 tratamentos por ciclo cultural e alternar o uso do produto com outros de diferente modo de ação.		14	(atividade curativa), Penetrante -possui mobilidade translaminar nas folhas.
flutriafol (triazol) (IBE-DMI)	IMPACT EVO (FMC/SERVAGONIS))	Apenas uma aplicação por ciclo cultural posicionada a partir do estágio BBCH60 até BBCH 89,		21*	Penetrante Translaminar e efeito de vapor e alta sistemica via xilema/ preventivo/ curativo e erradicante
fluxapiroxade (pirazois-carboximida)	SERCADIS 30 EC (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por campanha com este ou outro produto do mesmo grupo químico.		35	Preventivo/curativo, Sistemica ascendente
fluopirame (benzamida-piridina) (SDHI)	LUNA PRIVILEGE (BAYER)	Não exceder 2 aplicações por campanha no conjunto dos produtos contendo fluopirame e fluopicolida		14*/3**	Penetrante translaminar/ Preventivo/curativo
fluopirame+tebuconazol (benzamida-piridina e triazol) (SDHI+IBE-DMI)	LUNA EXPERIENCE (BAYER)	Não efetuar mais de 2 tratamentos por cultura /ano, com este ou outros produtos contendo fluopirame ou fluopicolida		14*	Penetrante translaminar/ movimento Sistémico/ preventivo/ curativo
	folpete (ftalamida)	FOLLOW 80 WG (NUFARM/SHARDA)		28*	Superfície/preventivo
	FOL-HITEC (SHARDA)				
folpete+piraclostrobina (ftalimida+estrobilurina) (QoI)	CABRIO STAR (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças, com este ou outro fungicida do mesmo grupo. Combate simultaneamente o míldio . E black rot Não fazer mais de 2 tratamentos consecutivos		42*	Superfície/Penetrante c/ mobilidade translaminar/ Preventivo /Curativo
hidrogenocarbonato de potássio (inorgânico)	ARMICARB (CERTIS/CADUBAL))	Máximo de plicações (4 a 8, dependendo do produto) A utilização do produto pode alterar a coloração dos bagos sem consequência nos processos de vinificação. Controla simultaneamente podridão cinzenta	SIM		Superfície/preventivo
	VITISAN (AGRICHEM/JOVAGRO)				
	BIO FUNGICIDA STOP (ANL)				
bacillus pumilus QST 2808 (microrganismo)	SONATA (BAYER)	Realizar no máximo 6 aplicações por campanha			Superfície/preventivo /induz a ativação das defesas da planta
Cerevisana –(paredes celulares da levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> estirpe LAS 117)	ROMEO (ALD)	Realizar no máximo 10 aplicações, tratamentos preventivos a partir das 3 a 5 folhas, com condições favoráveis à doença			
	ACTILEAF (AZX)				
Laminarina (molécula natural extraída de uma alga castanha)	VACCIPLANT (UPL /ARYSTA)	Da floração até ao fecho dos cachos devem ser mantidos os tratamentos com outras substâncias ativas		1	
óleo de laranja	OROCIDE®(ORO AGRI)	Provoca desidratação das paredes celulares dos esporos dos fungos. Combate simultaneamente o míldio. Nº máximo de aplicações -6 a 7		1	Superfície/curativo (provoca desidratação das paredes celulares dos fungos
	LIMOCIDE J (VIVAGRO)				
	PREV-GOLD® (ORO AGRI)				
	PREV-AM PLUS (OAEU)				
	PREV-AM ULTRA (OAEU)				
	PREV-AM® (ORO AGRI)				
cos-oga (extrato crustáceos/plantas)	FYTOSAVE (FYTOFEND)	Nº máximo de aplicações -8, aplicação antes do aparecimento da doença	3	Preventivo- Indutor das defesas naturais das plantas	
bacillus amyloliquefaciens estirpe FZB24	TAEGRO (NOVOZYM)	Realizar no máximo 10 aplicações por campanha	1		
metrafenona (benzofenona)	ATTENZO (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano alternando com fungicidas com outros modos de ação. Não efetuar mais de 2 aplicações consecutivas	NÃO	28	Penetrante com difusão sobre a forma de vapor /Preventivo/Curativo/ anti-esporulante
	VIVANDO (BASF)				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO OÍDIO DA VIDEIRA EM 2022 (CONTINUAÇÃO III)					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Designação comercial
meptildinocape (dinitrofenol)	KARATHANE STAR (DOW/LUSOSEM/CORTEVA)	Efetuar um máximo de 4 tratamentos por ano	NÃO	21	Superfície/ Preventivo/ Curativo
	XTRACT (CORTEVA)				
	ENVICTRO (DOW)			21	Penetrante com mobilidade Translaminar e sistêmica
	DIKAR PLUS (DOW/IQV Agro PT))				
Mefentriflulonazol (Triazol (IBE-DMI)	REVYSION (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano alternando com fungicidas com outros modos de ação. Trata simultaneamente Black rot		21	Penetrante com mobilidade Translaminar e sistêmica
miclobutanil (Triazol) IBE-DMI	RALLY PLUS (IQV AGRO PT)	Tratar a partir dos cachos visíveis, não efetuando mais de 3 tratamentos antes do fecho dos cachos e alternando com fungicidas com outro modo de ação. Combate simultaneamente o black rot		14	Com uma sistemias localizada típica dos triazóis,,espalha-se à volta dos pontos de penetração, quer nas folhas quer nos cachos/preventivo/cura tivo e anti-esporulante
	SYSTHANE STAR (DOW)			14	
	SYSTHANE ECOZOME (LUSOSEM)				
	MISHA 20 EW (SHARDA)			15	
	LICORNE (SPICAM)				
	SELECTANE (SELECTIS)				
miclobutanil +nafta petróleo (triazol + inorgânico) (IBE-DMI)	BRIK 20 EW (CQ MASSÓ)	Tratar a partir dos cachos visíveis, apenas 3 tratamentos antes do fecho dos cachos e alternar com fungicidas com outro modo de ação		14	
	MICLOTOP 20 EW(SHARDA)				
miclobutanil +1,2 benzotiazol-3(2h)-ona (triazolazol)	SYSTHANE 25 (DOW IBERICA)				
penconazol (triazol) IBE-DMI)	TOPAZE (SYNGENTA)	Tratar a partir dos cachos visíveis, apenas 3 tratamentos antes do fecho dos cachos e alternar com fungicidas com outro modo de ação		14	
	TOPAZE 200 W (SYNGENTA)				
	DOURO (ASCENZA)				
	DOURO 10 EC (ASCENZA)				
	VELKA (AGROTOTAL)				
	PENCOL 10 EC (SELECTIS)				
	ORISOS 200 EW (ADAMA)				
	PENCOL (SELECTIS)				
piraclostrobina (estrobilurina) (Qol)	CABRIO (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças (míldio e oídio)		35	Penetrante/Translaminar Preventivo/Curativo
piriofenona (benzofenona)	KUSABI (BELCHIM)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano		28*/14**	Penetrante sistemias local/Translaminar-com ação de vapor- Preventivo /curativo.
proquinazida (azanaftalenos) (AZN)	TALENDO (DUPONT/CORTEVA)	Efetuar um máximo de 3 tratamentos por/ano		28	Penetrante, mobilidade por difusão lateral e ação de vapor / Preventivo
proquinazida + tetraconosol (azanaftalenos+triazol) (AZN/IBE-DMI)	TALENDO EXTRA (CORTEVA)			30	Penetrante, mobilidade por difusão lateral e ação de vapor /com movimento Sistémico / Preventivo/ Curativo/anti- esporulante
tebuconazol (triazol) (IBE-DMI) (Continua pag. seg.)	TEBUTOP GOLD (SELEC TIS)	Não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha DMI mais de 1 a 3 vezes por campanha , (Consultar o rótulo) posicionados antes do fecho dos cachos. Alguns dos produtos estão apenas homologados para produção de uva para vinificação*	NÃO	7 a 14	Penetrante com Movimento Sistémico no xilema e difusão lateral nas células da proximidade da penetração/ / Preventivo/ Curativo
	TEBUTOP WG (SELECTIS				
	TEBU SUPER (SHAESP S)				
	TEBKIN (SHAESP S)				
	ENIGMA (ASCENZA)				
	AKORIOUS (AAKO BV)				
	DIVINUS (ROTAM)				
	TEBUCONAZOL VALLÉS				
	GANDY PLUS (AGCHEM)				
	ULISSES (JOVARGO)				
	LOUSAL (HELM AG)				
	FEZAN (SPICAM PORTUGAL)				
	TEBUCOLE PRO (SHARDA/EPAGRO)				
	ORIOUS 20 EW (MAKHTESHIM)				
	ORIOUS ULTRA (NUFARM_P)				
	LIBERO TOP (BAYER)				
	FOX WG ADVANCE (ASCENZA)				
	FOX PLUS (ASCENZA)				
	MYSTIC 25 WG (NUFARM)				
	DOMINIC (SHARDA/CADUBAL)				
	TOTEM PRO (SHARDA/AGROTOTAL)				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO [OÍDIO DA VIDEIRA](#) EM 2022 (CONCLUSÃO)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Designação comercial
tebuconazol (triazol) (IBE-DMI)	ARDENT 250 EW (SHARDA)	Não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha DMI mais de 1 a 3 vezes por campanha , (Consultar o rótulo) posicionados antes do fecho dos cachos. Alguns dos produtos estão apenas homologados para produção de uva para vinificação*	NÃO	7 a 14	Penetrante com Movimento Sistémico no xilema e difusão lateral nas células da proximidade da penetração/ / Preventivo/ Curativo
	TEBUCOLE 250 EW (SHAESP)				
	MYSTIC EW (NUFARM)				
	PRIAM TOP (IQV Agro PT)*				
	TEBUSHA PRO (SHARDA-COPRECHEM)				
	TOTEM (SHARDAL)				
	HORIZOM (BAYER)*				
	KADIMA (ROTAM)				
	TEBUSHA 25 EW (SHARDA)				
tebuconazol+trifloxistrobina (triazol + estrobilurina) (IBE-DMI/Qol)	FLINT MAX (BAYER)	A partir dos cachos visíveis, só 2 tratamentos posicionados até ao fecho dos cachos; alternar com fungicidas com outro modo de ação.		35	Penetrante Translaminar e-com Movimento Sistémico /Preventivo/ Curativo /anti-esporulante
tetraconazol (triazol) (IBE-DMI)	EMINENT 125 (ISAGRO/SPICAM)	Apenas 3 tratamentos, por ano e no total das doenças, até ao fecho dos cachos		30	Penetrante com Movimento Sistémico/ / Preventivo/ Curativo
	DOMARK (ISAGRO/SPICAM)				
	BAGANI (BELCHIM)				
trifloxistrobina (estrobilurina análoga) (Qol)	SAFIRA (GLOQUIMICOS)	Apenas 3 tratamentos por ano e no total das doenças, posicionados antes do fecho dos cachos, ação simultânea contra black rot		35	Absorvido pelas camadas cerosas com posterior redistribuição por ação de vapor e redeposição. Possui mobilidade lateral e translaminar essencialmente Preventivo/ anti-esporulante /com alguma ação Curativa
	FLINT (BAYER)				
	CONSIST (BAYER)				

Estação de Avisos de Entre Douro e Minho

Fonte: [sifito.dgav.pt](#) (consulta em 14/02/.2022)

Notas: [MPB](#) – modo de produção biológico; **I.S.** – Intervalo de segurança * Uvas para vinificação /** Uvas de mesa

A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo/Ficha Técnica dos produtos.

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO CINZENTA (BOTRYTIS) NA VIDEIRA EM 2022					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S.	Modo de ação
Aureobasidium pullulans (estirpes DSM 14940 e DSM 14941) (microorganismo)	BOTECTOR (BIO-FERM/NUFARM)	Microrganismo, composto por duas estirpes do fungo Aureobasidium pullulans . Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo , por nutrientes e espaço. Máximo 4 aplicações	SIM	1	Preventivo
Bacillus amyoliquefaciens QST 713 (microorganismo)	SERENADE MAX (BAYER)	Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo , por nutrientes e espaço.. Máximo 4 aplicações		-	
	SERENADE ASO (BAYER)				
Bacillus amyoliquefaciens estirpe MBI 600 (microorganismo)	SERIFEL (BASF)	Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo, por nutrientes e espaço.. Induz resistências por parte da planta. Na podridão cinzenta dos cachos (Botrytis cinerea), o SERIFEL® actua parando a germinação dos esporos e interrompendo o crescimento micelial, modificando a estrutura da membrana. Máximo 10 aplicações		3	
Bacillus amyoliquefaciens subsp. plantarum , estirpe D747(microorganismo)	AMYLO-X WG (MITSUI)	Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo , por nutrientes e espaço.. Induz resistências Máximo 6 aplicações		3	
Bacillus amyoliquefaciens estirpeFZB24(microorganismo)	TAEGRO (NOVOZYM)	Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo, por nutrientes e espaço.. Máximo 10 aplicações		1	
Pythium oligagandrum estirpe M1 (microorganismo)	POLYVERSUM (AGRICHEM)	Micoparasitas dos fungos patogénicos, colonizam, estimulam e induzem resistências nos tecidos , quer das raízes, quer da parte aérea das culturas. Máximo 4 aplicações.		-	
Saccharomyces cerevisiae estirpe laS02(microorganismo)	JULIETA (AGX)	Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo, por nutrientes e espaço Em anos de incidência normal, 4 tratamentos, em anos de maior incidência realizar um máximo de 6 tratamentos	1	Preventivo	
	HIVA (AGX)				
Trichoderma atroviride SC1 (microorganismo)	VINTEC® (Bi-PA)	Fungo antagonista, que possui atividade preventiva.Tem como principal modo de ação , entrar em competição por espaço e nutrientes com os agentes patogénicos. Indutor dos mecanismos de defesa das plantas. Aplicar a partir da queda de 80% dos estames (BBCH 68) Máximo 4 aplicações.	1	Preventivo	
hidrogenocarbonato de potássio (inorgânico)	ARMICARB (CERTIS)	Máximo 8 aplicações.Em uva de mesa aplicar antes do vingamento. A aplicação do produto pode causar marcas e rugosidades nos bagos, Trata simultaneamente o controlo do oídio.	NÃO	1	Superfície/ Preventivo
	BIO FUNGICIDA STOP	Máximo 5 aplicações	SIM	1	
cerevisana (Saccharomyces cerevisiae)	ACTILEAF (AGRAUXIM)	Indutor das defesas naturais das plantas. Máximo 10 aplicações		1	Preventivo
	ROMEO (KENUGARD)			1	
boscalide (carboximida) (SDHI)	VINITUS	Não efetuar mais de 1 aplicação	NÃO	21	
	BOSCAVI (SHAESP)			28	Propriedades. sistémicas /Preventivo
	CANTUS (BASF)			28	
ciprodinil (anilino pirimidina)	CARDINAL (SELECTIS)	Não efetuar mais de 1 aplicação.Se no período de 2 horas a seguir à aplicação do produto se verificar uma chuva, deve repetir-se o tratamento			14*/7**

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO CINZENTA (BOTRYTIS) NA VIDEIRA EM 2022					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação
ciprodinil (anilinopirimidina)	EQUADOR (SAPEC)		Não	14*/7**	Sistémico/ Superfície/Preventivo/Cu rativo
	QUALY (ADAMA)			21*/7**	
ciprodinil+fludioxonil (anilinopirimidina + cianopirrole)	SWITCH 62.5 WG (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 2 tratamentos por campanha, trata simultaneamente o oídio			
ciprodinil+tebuconazol (anilinopirimidina + triazol) (IBE-DMI)	BENELUS (ADAMA)	Não efetuar mais de 1 tratamentos por campanha		21*/**2 8	Sistémico/Penetrante com movimento sistémico no xilema e difusão lateral/Atividade preventiva e curativa
eugenol+geraniol+timol (terpenos)	ARAW (EDEN)	É um fungicida com base em extratos de plantas	Sim	3*/7**	Preventivo/curativo
fenehexamida (carboxamida) (IBE)	SONAR (BAYER)	Não efetuar mais de 2 tratamentos por cultura, alternar com produtos com outro modo de ação	Não	14*/7**	Superfície/ Preventivo/acção penetrante e mobilidade translaminar
	TELDOR (BAYER)				
fenehexamida (carboxamida) (IBE)	TELDOR SC(BAYER)	Não efetuar mais de 2 tratamentos por cultura, alternar com produtos com outro modo de ação		14*/7**	Superfície/ Preventivo/acção penetrante e mobilidade translaminar
	TELDOR HORTO SC(BAYER)				
	GREYSTAR ()				
fludioxonil (fenilpirrole)	GOLEN (SYNGENTA)	No máximo 2 aplicações por cultura		21*/7**	Superfície/ Preventivo
	GEOXE (SYNGENTA)				
fluaziname (2,6- dinitroanilina)	TIZCA (FMC)	Não efetuar mais de 1 tratamentos		28	Contacto/preventivo
	FLUAZIK 500 (AUVERONE)				
	BANJO (ADAMA)				
	FLUAZINOVA (FINCHIM)	Não efetuar mais de 3 tratamentos. Apenas para uvas de mesa		21	
fenepirazamina (amino- pyrazolinone)	PROLECTUS (NUFARM)	Efetuar apenas 1 tratamentos por campanha no conjunto dos fungicidas que contenham fenepirazamina e fenehexamida		14*/7**	Penetrante/translaminar /preventivo e curativo/anti-esporulante
folpete (ftalamina)	FOLLOW 80 WG (NUFARMA/SHARDA)	Máximo 8 tratamentos e apenas em uvas para vinificação	28*	Contacto/ Preventivo	
	FLEXI 80 WG (SHAESP)				
	FOLET 80 WG (AGROTOTAL)				
	FOLPETIS (SELECTIS)				
	FOL-HITEC (SHAESP)				
isofetamida (phenyl-oxo-ethyl thiophene)	KRIOR (ISK)	Efetuar apenas 1 tratamentos por campanha, a partir do fim da floração.	21	Preventivo/ Contato,mobilidade translaminar	
	KENJA (BELCHIM)				
	ZENBY (ISK)				
mepanipirime (anilinopirimidina)	FRUPICA (SIPCAM)	Não efetuar mais que um tratamento por campanha com estes produtos ou com outros com o mesmo modo de ação	Não	21	Contato, Curativo, Preventivo, Translaminar
pirimetanil (anilinopirimidina)	MALAKITE (BASF)				Penetrante/ Translaminar e com ação de vapor/Preventivo/Curativ o
	PYRUS 400 SC (AGRIPHAR)				
	SCALA (BASF)				
	EPITLUS 40 SC (SELECTIS)				
	PYRUS (ARYSTABN)				
	ERUNE 40 EC (ASCENZA)				
	AVALON (FITO)				
	PRETIL (AFRASA)				
LAITANE (LAINCO)					
Tebuconazol (triazol)	MYSTIC EW (NUFARM)	Efetuar apenas 2 tratamentos por campanha, com este ou outro produto com atividade DMI		14	Penetrante com movimento sistémico no xilema e difusão lateral/Atividade preventiva e curativa

Estação de Avisos de Entre Douro e Minho

Fonte: sifito.dgav.pt (consulta em 24/02/2022)

Notas: **MPB** – Modo de produção biológico; **I.S.** – Intervalo de segurança * uva apenas para vinificação/** Em Uva de Mesa

A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo/Ficha Técnica dos produtos